



高等数学 A1

浙江理工大学期中试题汇编

(答案册)

学校: _____

专业: _____

班级: _____

姓名: _____

学号: _____

(此试卷为 2021 年第二版)

目录

1 浙江理工大学 2020—2021 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	1
2 浙江理工大学 2019—2020 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	3
3 浙江理工大学 2018—2019 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	7
4 浙江理工大学 2017—2018 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	11
5 浙江理工大学 2016—2017 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	14
6 浙江理工大学 2014—2015 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	15
7 浙江理工大学 2012—2013 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	16
8 浙江理工大学 2011—2012 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	17
9 浙江理工大学 2010—2011 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	19
10 浙江理工大学 2008-2009 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题.....	20

（高数系列试卷见本书最后一页。如有其他需要，请加入 QQ 群获取其他资料）

试卷整理人：张创琦

版次：2021 年 8 月 9 日 第二版

微信公众号：创琦杂谈

QQ 号：1020238657（如果您觉得哪道题目答案或者试题有问题，请联系张创琦本人。十分感谢您的勘误！）

创琦杂谈学习交流群（QQ 群）：749060380

创琦杂谈大学数学学习交流群（QQ 群）：967276102

版权声明：试卷整理人：张创琦，试卷首发于 QQ 群“创琦杂谈学习交流群”和“创琦杂谈大学数学学习交流群”，转发前需经过本人同意，侵权后果自负。本资料只用于学习交流使用，禁止进行售卖、二次转售等违法行为，一旦发现，本人将追究法律责任。解释权归本人所有。

在这里感谢我的高数老师以及其他老师们对我的鼎力帮助！（高数老师不让我写上她的名字，那我就在这里默默感谢她吧）

1 浙江理工大学 2020—2021 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一、选择题

1. A 2. B 3. A 4. D 5. C 6. D

二、填空题

1. $x=0, y=1$; 2. $1/2$; 3. $y=x-1$;4. $(x^2 + 20x + 90)e^x$; 5. $3e^x(\cos x - \sin x)dx$; 6. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

三、计算题

1. 解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x \cdot \frac{1}{3} x^2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x^2} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$
 $= 1 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

2. 解: $f(1)=0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - 1) = 0 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + b) = a + b \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

可导一定连续, 由 $x=1$ 处的连续性知 $a+b=0$

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax + b}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{a(x - 1) + a + b}{x - 1} = a$$

由可导性知: $a=2$ 。所以 $b=-2$6 分3. 解: $\frac{dx}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}$ $\frac{dy}{dt} = \frac{-1}{1+t^2}$ 2 分

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-1}{2t} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1+t^2}{4t^3} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

4. 解: 当 $x=0$ 时, 带入原方程可得 $y=1$, 1 分方程的两边同时对 x 求导, 得:

$$\frac{\left(\frac{x}{y}\right)'}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}} (x^2+y^2)' \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

整理得, $y' = \frac{y-x}{x+y} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

将 (0, 1) 带入上式 $y'(0) = 1 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

5. 解: 函数表达式两边取对数, $\ln y = \frac{\ln(1+x)}{x} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

上式两边求导, 得到, 即 $\frac{y'}{y} = \frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}, y' = y \frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)} \dots\dots 4 \text{ 分}$

因此, $dy = \frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)} (1+x)^{\frac{1}{x}} dx \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

四、综合题

1. 解: 若 $k=0$ 时, 则 $y=0$, 它是一条直线, 没有拐点, 因此 $k \neq 0$;

$$f'(x) = 4k(x^3 - 3x), f''(x) = 12k(x^2 - 1) \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

令 $f''(x) = 0$, 得 $x = \pm 1 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

当 $x < -1$ 时, $ky'' > 0$; 当 $-1 < x < 1$ 时, $ky'' < 0$; 当 $x > 1$ 时, $ky'' > 0$ 。所以

($\pm 1, 4k$) 为拐点 $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

所以在点 (1, $4k$) 处的法线方程: $y - 4k = \frac{1}{8k}(x - 1),$

在点 (-1, $4k$) 处的法线方程: $y - 4k = \frac{1}{-8k}(x + 1) \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

如果它们通过原点, 得 $-4k = \frac{1}{-8k} \Rightarrow k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

2. 解: $f'(2) = 3(x^2 - a) \Big|_{x=2} = 0 \Rightarrow a = 4, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

又 $f(2) = 8 - 6a + b = 8$, 解方程组得, $a = 4, b = 24 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

故 $f(x) = x^3 - 12x + 24$ 。令 $f'(x) = 3(x+2)(x-2) = 0$, 得 $x = 2$, 或 $x = -2$ 。

从而可得下表,

	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f'	+	0	-		+
f	增	极大值 40	减	极小值 8	增

.....6 分

所以， $(-\infty, -2)$ ， $(2, +\infty)$ 是增区间， $(-2, 2)$ 为减区间，极大值为 40，极小值为 8....8 分

五、证明题

1.证：

设 $f(x) = \tan x - x - \frac{1}{3}x^3, x \in [0, \frac{\pi}{2})$, 则 $f(0)=0$,1 分

$f'(x) = \sec^2 x - 1 - x^2 = \tan^2 x - x^2 > 0, x \in (0, \frac{\pi}{2})$2 分

所以， $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增，所以当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ ， $f(x) > f(0)=0$.

即 $\tan x > x + \frac{1}{3}x^3$4 分

2. 令 $F(x)=f(x)\sin x$ ，则 $F'(x) = f' \sin x + f \cos x$1 分

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且 $F(0)=F(1)=0$ 。2 分

由罗尔中值定理，存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$. 即 $f'(\xi) = -f(\xi) \cot \xi$4 分

2 浙江理工大学 2019—2020 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一、选择题

1.B 2.C 3.C 4.B 5.B 6.D

二、填空题

1). $\sqrt{1+4x^2} dx$ 2 $2). (-1)^{n-1}(n-1)!$ 3). 2 1

4). $(x^2 + 40x + 380)e^x$ 5). $3e^x(\cos x - \sin x)dx$ 6). $\sqrt{3}$

1. B

1) $\because a_n > 0, \therefore S_n = S_{n-1} + a_n > S_{n-1} \therefore \{S_n\}$ 单调递增

又 $\{S_n\}$ 有界 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = A$ (存在) (\because 单调有界数列必收敛)

$$\therefore a_n = S_n - S_{n-1} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = 0$$

即 $\{a_n\}$ 收敛 (到 0)

\therefore 当 $a_n > 0$ 时, $\{S_n\}$ 有界 $\Rightarrow \{a_n\}$ 收敛

(2) 反之不成立. 举反例

如 $a_n = 1$, 则 $\{a_n\}$ 收敛, 但 $S_n = 1 + 1 + \dots + 1 = n$, $\{S_n\}$ 无界.

2. C

A. (1, 0): $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4 \triangleq (x-1) \cdot f_1(x)$ 则

$$y' = f_1'(x) + (x-1)f_1'(x), y'' = f_1''(x) + f_1'(x) + (x-1)f_1''(x), y''|_{x=1} \neq 0 \text{ 排除 A 选项}$$

B. (2, 0): 令 $y = (x-2)^2 f_2(x)$ 则 $y' = 2(x-2)f_2'(x) + (x-2)^2 f_2'(x)$

$$y'' = 2f_2'(x) + 2(x-2)f_2''(x) + 2(x-2)f_2'(x) + (x-2)^2 f_2''(x), y''|_{x=2} \neq 0 \text{ 排除 B}$$

C. (3, 0): 令 $y = (x-3)^3 f_3(x)$ 则 $y' = 3(x-3)^2 f_3'(x) + (x-3)^3 f_3'(x)$

$$y'' = 6(x-3)f_3'(x) + 3(x-3)^2 f_3''(x) + 3(x-3)^2 f_3'(x) + (x-3)^3 f_3''(x)$$

$$= (x-3)[6f_3'(x) + 6(x-3)f_3''(x) + 3(x-3)^2 f_3''(x)], y''|_{x=3} = 0 \text{ 且符号改变, 选 C}$$

D. (4, 0): 令 $y = (x-4)^4 f_4(x)$ 则 $y' = 4(x-4)^3 f_4'(x) + (x-4)^4 f_4'(x)$

$$y'' = 12(x-4)^2 f_4'(x) + 4(x-4)^3 f_4''(x) + 4(x-4)^3 f_4'(x) + (x-4)^4 f_4''(x)$$

$$= (x-4)^2 [12f_4'(x) + 8(x-4)f_4''(x) + (x-4)^2 f_4''(x)], y''|_{x=4} = 0 \text{ 但符号不变, 排除 D}$$

3. C

$\because f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx)}{x} = 3 \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx}{x} = m, \therefore m=3$

4. B

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{3x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{(3x)} = \frac{1}{6} \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{6}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{2x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{(2x)} = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

15 B.

∵ A. $e^x - 1 \sim x$. B. $\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}$. C. $\tan x \sim x$. D. $\ln(1+x) \sim x$. (当 $x \rightarrow 0$ 时)
∴ B 入选.

16 D.

A. 函数在某点连续, 不一定在该点可导. \times ∵ 可导 \Rightarrow 连续.
B. 函数在某点不可导, 不一定在该点不连续. \times ∵ 如 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导但连续.
C. 函数在某点不可导, 不一定在该点连续. \times ∵ 如 $y=\sin(x)$ 在 $x=0$ 处.
D. 函数在某点可导, 一定在该点连续. \checkmark

$$2. ds = \sqrt{1+4x^2} dx, \quad k=2.$$

$$\because y = -x^2 + 1, \quad ds = \sqrt{1+(y')^2} dx = \sqrt{1+(2x)^2} dx = \sqrt{1+4x^2} dx.$$

$$k = \frac{|y''|}{(1+(y')^2)^{3/2}} = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}, \quad \text{顶点}(0, 1).$$

$$\therefore k|_{\text{顶点}} = \frac{2}{(1+4 \times 0^2)^{3/2}} = 2.$$

$$2. f'(0) = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)!$$

$$\begin{aligned} \because f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)}{x} \\ &= (e^0 - 2)(e^0 - 3) \cdots (e^0 - n) = (-1)(-2) \cdots (-n+1) = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)! \end{aligned}$$

3. 渐近线条数为 2 条, 无穷间断点有 1 个.

$$\because \text{水平: } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} = 1, \quad \therefore y=1 \text{ 是水平渐近线.}$$

$$\text{铅直: 疑似有 } x = \pm 1. \quad \begin{cases} x \rightarrow 1^+ \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x-1} = \infty, \quad \therefore x=1 \text{ 是铅直渐近线.} \\ x \rightarrow 1^- \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{x-1} = -\infty, \quad \text{也是无穷间断点.} \end{cases}$$

$$\text{斜: } k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x}{(x^2 - 1)x} = 0, \quad \therefore \text{无斜渐近线.}$$

$$\begin{aligned} 4. y^{(20)} &= (x^2 e^x)^{(20)} = C_{20}^0 (x^2)^{(10)} (e^x)^{(10)} + C_{20}^1 (x^2)' (e^x)^{(11)} + C_{20}^2 (x^2)'' (e^x)^{(18)} \\ &= x^2 \cdot e^x + 20 \times 2x \cdot e^x + \frac{20 \times 19}{2} \times 2 \cdot e^x \\ &= (x^2 + 40x + 380)e^x \end{aligned}$$

$$5. dy = y' dx = (3e^x \cos x)' dx = (3e^x \cos x - 3e^x \sin x) dx = 3e^x (\cos x - \sin x) dx$$

6. $\because f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上满足罗尔定理条件, \therefore 至少 $\exists \xi \in (0, 3)$, s.t. $f'(\xi) = 0$.

$$\text{而 } f'(x) = (x^3 - 9x + 2)' = 3x^2 - 9, \quad \text{要使 } f'(\xi) = 0, \quad \xi = \pm\sqrt{3}, \quad (\xi \in (0, 3), \text{ 取正值})$$

$$\therefore \xi = \sqrt{3}$$

三、计算题

1. 解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x}$

2 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$$

3 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x}$$

4 分

$$= 2$$

5 分

2. 解：原式 $=\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{2!}\right) + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right) + \cdots \left(\frac{(n+1)-1}{(n+1)!}\right) \right]$ 3 分

$$=\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{(n+1)!} \right]$$
 4 分

$$=1$$
 5 分

3. 解：可导一定连续，由连续性知： $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} b(1 - x^2) = b$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{ax} = 1 \therefore b = 1$$

-----2 分

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{b(1 - x^2) - b}{x - 0} = 0$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} - b}{x - 0} = a$$
 -----4 分

由可导性知： $a = 0$ -----5 分

4. 解： $\frac{dx}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}$ $\frac{dy}{dt} = \frac{-1}{1+t^2}$ 2 分

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-1}{2t}$$
 3 分

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1+t^2}{4t^3}$$
 5 分

5. 解：当 $x=0$ 时，带入原方程可得 $y=1$ ， 1 分

方程的两边同时对 x 求导，得： $\cos(y + xy')\cos(xy) + \frac{y'-1}{y-x} = 1$ 4 分

将 $(0, 1)$ 带入上式 $y'(0) = 1$ 5 分

6. 解：函数表达式两边取对数， $\ln y = \sin x \cdot \ln x$ 2 分

上式两边求导，得到 $\frac{y'}{y} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}$ ，即 $y = y' \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$ 4 分

$$dy = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right) dx$$
 5 分

四、综合题

1. 解： $f'(x) = nx^{n-1}$ ，在 $(1, 1)$ 处 $k = f'(1) = n$ ， 2 分

切线方程为： $y - 1 = n(x - 1)$ ， 3 分

令 $y=0$ ，可得切线与 x 轴交点 $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ ， 4 分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$$
 6 分

2. 解：由于 $f(x)$ 为可导函数，且在 $x=1$ 处有极值，故 $f'(1) = (3x^2 + 2ax + b)|_{x=1} = 0$ ，

即 $3 + 2a + b = 0$ 。又 $f(1) = 1 + a + b = -2$ ，解方程组得， $a = 0$ ， $b = -3$ 。

故 $f(x) = x^3 - 3x$ 。令 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ ，得 $x = 1$ ，或 $x = -1$ 。

令 $f''(0) = 6x = 0$ ，解得 $x = 0$ 。从而可得下表，

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \infty)$
f'	+	0	-		-	0	+
f''	-		-	0	+		+
f	增，凸	极大值 2	减，凸	拐点(0, 0)	减，凹	极小值-2	增，凹

所以，(1) $(-\infty, -1)$ ， $(1, \infty)$ 是增区间， $(-1, 1)$ 为减区间，极大值为 2，极小值为 -2；

(2) $(-\infty, 0)$ 是凸区间， $(0, \infty)$ 为凹区间，拐点为 $(0, 0)$ 。

五、证明题

1. 证：函数 $f(x) = \ln x$ ，定义域 $(0, +\infty)$ ， $f'(x) = \frac{1}{x}$ ， $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ ，在定义域上为凸函数，根据凸函数定义知： $\ln \frac{x+y}{2} > \frac{\ln x + \ln y}{2} = \ln \sqrt{xy}$ 得证

2. 原式等价于 $\frac{f'(\xi)}{a+b} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$ ，即 $\frac{f'(\xi)(b-a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$ 。因为函数在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，故有 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ ， $\xi \in (a, b)$ 。

又因为 $f(x)$ 和 x^2 在 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理的条件，所以有 $\frac{f'(\xi)(b-a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$ ，化简可得原命题成立。

3 浙江理工大学 2018—2019 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一、选择题. 1. D 2. B 3. B 4. D 5. B 6. C

二、填空

1. $a = -2, b = 1$ 2. $\frac{1}{2}$ 3. 2

4. 1 5. $(-1)^n 2 \cdot n! (1+x)^{-(n+1)}$ 6. $\left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{2}{e}}$

三 1.解:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right] &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{(1+t) \ln(1+t) - t}{t \ln(1+t)} \right] \text{-----2分} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{(1+t) \ln(1+t) - t}{t \cdot t} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) + 1 - 1}{2t} \text{-----4分} \\ &= \frac{1}{2} \text{-----5分}\end{aligned}$$

2. 解:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{(e^x - 1)(\sqrt[3]{1+x^2} - 1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x \cdot \frac{1}{3}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{\frac{x^3}{3}} \text{-----3分} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{x^2} = 1 \text{-----5分}\end{aligned}$$

3.解:

$$y' = 1 \cdot \arcsin \frac{x}{2} + x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{4-x^2}} \cdot (-2x) = \arcsin \frac{x}{2} \text{-----3分}$$

$$dy = y' dx = \arcsin \frac{x}{2} dx \text{-----5分}$$

4. 解: 可导一定连续

(1) 由连续性知

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{x}{2}}{x} = \frac{1}{2} \text{-----2分} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax + b) = b, \quad f(0) = b, \therefore b = \frac{1}{2} \text{-----3分 (2)}\end{aligned}$$

由可导性知

$$\begin{aligned}f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 - 2\sqrt{1-x} - x}{2x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x}} - 1}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{4x\sqrt{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{x}{2}}{4x} = \frac{1}{8} \text{-----4分} \\ f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{x} = a, \therefore a = \frac{1}{8} \text{-----5分}\end{aligned}$$

5. 解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t - \cos t + t \sin t}{\frac{1}{\cos t}(-\sin t)} = -t \cos t$, -----2 分

$\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{-\cos t + t \sin t}{\frac{1}{\cos t}(-\sin t)} \Big|_{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}-\pi}{6}$ -----5 分

四、1 解: $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$, $\therefore x=0, x=2$ 是所有的可能的极值点-----1 分

$y'' = 6x - 6$ $\therefore x=0$ 是所有的可能的凹凸性改变的点-----2 分

分

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	+	0	-	-	-	0	+
y''	-	-	-	0	+	+	+
y	增、凸	极大值 9	减、凸	拐点 (1,7)	减、凹	极小值 5	增、凹

单调增加区间: $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$, 单调减少区间: $[0, 1] \cup [1, 2]$, 极大值: 9, 极小值: 5-----4 分

分

凸区间: $(-\infty, 1]$, 凹区间: $[1, +\infty)$, 拐点: (1,7) -----6 分

分

2 解: $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$ -----3 分

2. 当 $x > 0$ 时, $f(x)$ 连续; 当 $x < 0$ 时, $f(x)$ 连续; -----4 分

当 $x = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

所以 $f(x)$ 处处连续。-----6 分

3. 法一: 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x} (x > 0)$, 则-----2 分

$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, $x = e$ 是可导区间内的唯一驻点-----3 分

$x < e$ 时, $f'(x) > 0$; $x > e$ 时, $f'(x) < 0 \Rightarrow f_{\max} = f(e) = \frac{1}{e}$ -----4 分

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ -----5 分

∴ 当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时，有 2 个实根；当 $a = \frac{1}{e}$ 时，有 1 个实根；当 $a > \frac{1}{e}$ 时，有 0 个实根。6 分

4. 法二：令 $f(x) = \ln x - ax (x > 0)$ ，则-----2 分

$f'(x) = \frac{1}{x} - a$, $x = \frac{1}{a}$ 是可导区间内的唯一驻点-----3 分

$0 < x < \frac{1}{a}$ 时， $f'(x) > 0$; $x > \frac{1}{a}$ 时， $f'(x) < 0 \Rightarrow f_{\max} = f\left(\frac{1}{a}\right) = \ln \frac{1}{a} - 1$ -----4 分

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ -----5 分

∴ 当 $\ln \frac{1}{a} - 1 > 0$ 时，即 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时，有 2 个实根；-----6 分

当 $\ln \frac{1}{a} - 1 = 0$ 时，即 $a = \frac{1}{e}$ 时，有 1 个实根；

当 $\ln \frac{1}{a} - 1 < 0$ 时，即 $a > \frac{1}{e}$ 时，有 0 个实根。

五、1. 证明：要证 $(1 + \xi^2)f'(\xi) = 1$ ，只需证 $f'(\xi) - \frac{1}{1 + \xi^2} = 0$ ，

令 $F(x) = f(x) - \arctan x$ -----2 分

∵ $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续， $(0, 1)$ 内可导， $F(0) = 0, F(1) = 0$

∴ 由罗尔定理知：至少 $\exists \xi \in (0, 1)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$

即 $\exists \xi \in (0, 1)$ ，使得 $(1 + \xi^2)f'(\xi) = 1$ 。-----4 分

2. 证明：令 $f(x) = (1 + x)\ln x - 2(x - 1)$ ，即证 $f(x) > 0, (x > 1)$ -----2 分

因为 $f'(x) = \ln x + \frac{1}{x} - 1$ ，-----3 分

$f''(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} > 0, (x > 1) \Rightarrow f'(x)$ 在 $x \geq 1$ 时单增 $\Rightarrow f'(x) > f'(1) = 0 (\forall x > 1)$ -----4 分

$\Rightarrow f(x)$ 在 $x \geq 1$ 时单增 $\Rightarrow f(x) > f(1) = 0, (\forall x > 1)$ ，得证。-----5 分

4 浙江理工大学 2017—2018 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一、选择题. 1. C 2. D 3. A 4. D 5. A 6. C

二、填空

1. $a=3, b=0$ 2. $1 < a < 2$ 3. $e^{\frac{2}{e}}$ ($x=e^{-1}$)

4. 3, 5. -1, 6. $x=0, y=1$

三 1. 解:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} \right] \text{-----2分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x - \ln(1+x)}{x \cdot x} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} \text{-----4分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2} \text{-----5分}$$

2. 解:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} e^{\ln(\sin x)^{\tan x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} e^{\tan x \ln(\sin x)} \text{-----2分}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x \ln(\sin x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin x)}{\cot x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\sin x} \cos x}{-\csc^2 x} = 0 \text{-----4分}$$

$$\therefore \text{原式} = e^0 = 1 \text{-----5分}$$

3. 解:

$$\frac{n(n+1)}{n^2+2n} = \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n} \leq \frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n} \leq \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1} = \frac{n(n+1)}{n^2+n+1} \text{-----2分}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{n^2+2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{n^2+n+1} = \frac{1}{2} \text{-----4分}$$

由夹逼准则知所求极限为 $\frac{1}{2}$ -----5 分

4. 解：方程两边同时求导

$$e^{x+y}(1+y') - \sin xy(y+xy') = 0 \text{ -----3 分}$$

$$\therefore y' = \frac{y \sin xy - e^{x+y}}{e^{x+y} - x \sin xy} \text{ -----5 分}$$

$$5. \text{ 解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{f'(t) + tf''(t) - f'(t)}{f''(t)} = t, \text{ -----2 分}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(t)}{dx} = \frac{1}{f''(t)} \text{ -----5 分}$$

6. 解：可导一定连续，由连续性知：

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} b(1-x^2) = b$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{ax} = 1$$

$$\therefore b = 1 \text{ -----2 分}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{b(1-x^2) - b}{x - 0} = 0$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} - b}{x - 0} = a \text{ -----4 分}$$

由可导性知： $a = 0$ -----5 分

四、1 解： $f(x)$ 的间断点为： $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = -2$ -----1 分

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 2x}{|x|(x^2 - 4)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x-2)x}{-x(x^2 - 4)} = -\frac{1}{2}$$

$\therefore x = 0$ 是第一类跳跃间断点； -----3 分

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 2x}{|x|(x^2 - 4)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x-2)x}{x(x^2 - 4)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{|x|(x^2 - 4)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)x}{x(x^2 - 4)} = \frac{1}{4} \text{ -----5 分}$$

$\therefore x = 2$ 是第一类可去间断点

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 2x}{|x|(x^2 - 4)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-2)x}{-x(x^2 - 4)} = \infty \text{ -----6 分}$$

$\therefore x = -2$ 是第二类无穷间断点

2. 解：由条件可得

$$\begin{cases} y(-2) = 44 \\ y'(-2) = 0 \\ y(1) = -10 \\ y''(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = -24 \\ d = 16 \end{cases} \text{-----4 分}$$

$$\therefore y = x^3 - 3x^2 - 24x + 16$$

单调增加区间: $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$ -----5 分

单调减少区间: $(-2, 4)$ -----6 分

凸区间: $(-\infty, 1)$ -----7 分

凹区间: $(1, +\infty)$ -----8 分

五、1.证明: 要证 $a^b > b^a$, 只需证 $b \ln a > a \ln b$, 令 $f(x) = x \ln a - a \ln x$ ($x \geq a$) -----2 分

$$\therefore f'(x) = \ln a - \frac{a}{x} > 1 - \frac{a}{x} \geq 0 (x \geq a),$$

$\therefore f(x)$ 在 $x \geq a$ 时单调增加,

$$\therefore b > a \text{ 时, } f(b) > f(a) = 0$$

即 $b \ln a > a \ln b$, 所以 $a^b > b^a$. -----4 分

2

证 先证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$. 用反证法.

若不存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$, 则在 (a, b) 内恒有 $f(x) > 0$ 或 $f(x) < 0$, 不妨设 $f(x) > 0$ (对 $f(x) < 0$, 类似可证), 则

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x - a} \geq 0,$$

$$f'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{x - b} \leq 0.$$

从而 $f'(a) f'(b) \leq 0$, 与已知条件矛盾. 所以在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.

再证存在 $\eta \in (a, b)$, 使 $f''(\eta) = 0$.

由 $f(a) = f(b) = f(\xi)$ 及罗尔定理知, 存在 $\eta_1 \in (a, \xi)$ 和 $\eta_2 \in (\xi, b)$, 使 $f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = 0$, 再在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上对函数 $f'(x)$ 运用罗尔定理, 知存在 $\eta \in (\eta_1, \eta_2) \subset (a, b)$, 使 $f''(\eta) = 0$.

5 浙江理工大学 2016—2017 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一、选择题。

1-6 C D A B B C

二、填空题。

1 2 $x = \pm\sqrt{2}, y = 0$ 3 $\frac{1}{2}$

4 $(-1, 0)$ 或 $(-1, 0]$ 5 $2e^{x^2}(2x\cos x - \sin x)dx$ 6 $\ln 2$ 或 $\frac{1}{3}\ln \xi$

三、计算题

1. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\frac{x}{4}}-1}{\sin 2x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(\frac{x}{4})}{2x} = \frac{1}{8}$

2. 解:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \ln(1-x) - 1}{x - \arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \frac{1}{1-x}}{1 - \frac{1}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x)e^x - 1}{x^2} \cdot \frac{1+x^2}{1-x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x)e^x - 1}{x^2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^2}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-xe^x}{2x} = -\frac{1}{2}$$

3. 解: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

4. 解: 方程两边对 x 求导得 $y + xy' = (1+y')e^{x+y}$, 所以 $y' = \frac{e^{x+y} - y}{x - e^{x+y}}$

5. 解: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{1+t^2}{2t}} = \frac{1}{2t}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \frac{dy}{dx}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{1}{2t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = -\frac{1+t^2}{4t^3}$

6. 解: 由于 $x > 0, x < 0$ 时 $f(x)$ 是初等函数, 故可导, 所以只需 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导即可。若函数在 $x = 0$ 可导, 则必在 $x = 0$ 连续。又

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x) = 0, f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax+b) = b$$

所以由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续可得 $f(0^+) = f(0^-) = f(0) = 0$, 得 $b = 0$ 。

$$\text{又 } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)-0}{x-0} = 1, f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax-0}{x-0} = a$$

故由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 只需要 $f'_+(0) = f'_-(0)$, 即 $a = 1$

四、

1. 解: $y' = -\frac{1}{x^2} + 2x$, $y'' = \frac{2}{x^3} + 2 = 0$, $x = -1$, 拐点 $(-1, 0)$, $y'(-1) = -3$,

 \therefore 所求切线方程为: $y = -3(x+1)$, 即 $3x + y + 3 = 0$ 。

6 浙江理工大学 2014—2015 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一、选择题 (6 小题×4 分=24 分)

1-6 C D A D B D

二、填空题 (6 小题×4 分=24 分)

1 0 e 2 $\frac{1}{2}$ 3 $-\frac{2}{x(1+\ln x)^2} dx$
 4 $-\sqrt{2}$ 5 $-2^n(n-1)!$ 6 0 27

三、计算题 (5 小题×5 分=25 分)

1 (提示: 分子有理化, 等价代换, 答案: $-\frac{1}{4}$)

2 (提示: 重要极限 II 求出 $y = xe^{3x}$, 因此 $\frac{dy}{dx} = (1+3x)e^{3x}$)

3 (提示: 夹逼定理, 答案: 1)

4 (提示: 隐函数求导法, 答案: $y' = \frac{1}{2+\ln y}, y'' = -\frac{1}{y(2+\ln y)^3}$)

5 (提示: 先设切点, 答案: $x+25y=0, x+y=0$)

四、解答题 (2 小题×6 分=12 分)

1 (提示: 用洛必达法则, (1) $a = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = f'(0)$;

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{f''(0)}{2}, \quad g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \frac{f''(0)}{2})$$

2 (答案: (1) $(-\infty, -1), (1, +\infty)$ 是增区间, $(-1, 1)$ 为减区间, 极大值为 2, 极小值为 -2; (2)

$(-\infty, 0)$ 是凸区间, $(0, +\infty)$ 为凹区间, 拐点为 $(0, 0)$)

五、数学建模题 (本题 7 分)

(提示: 漏斗中现存水的容量为 $V_1 = \frac{\pi x^3}{27}$, 桶中现有水的容量为 $V_2 = 25\pi y$, $\frac{dV_1}{dt} = -\frac{dV_2}{dt}$,

$$\text{所以 } \frac{dy}{dt} = -\frac{x^2}{225} \frac{dx}{dt} = 0.64 \text{。})$$

六、证明题 (2 小题×4 分=8 分)

1 (提示: 作辅助函数 $F(x) = \ln x$, 在 $[a, b]$ 上使用柯西中值定理。)

2 (提示: 令 $f(x) = x^2 - x \sin x - \cos x$, 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right], \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上分别使用零点定理, 证明至少有两个零点。再用罗尔定理反证, 不可能有更多的零点。)

7 浙江理工大学 2012—2013 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一 选择题

1. A 2. B 3. B 4. C 5. D 6. A

二 填空题

1. 2; 2. 0; 3. e^2 ; 4. $(x^2 + 40x + 380)e^x$; 5. $2xdx$; 6. $x = 1$

三 计算题

$$1 \text{ 解: } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + e^x)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^x}{x + e^x}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{e^x} + 1}{\frac{x}{e^x} + 1}} = e$$

$$2 \text{ 解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + f(x)\sin x} - 1}{e^{3x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)\sin x}{2}}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{6} = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 12$$

$$3 \text{ 解: } y' = \left(x \arcsin \frac{x}{2} + \sqrt{4 - x^2} \right)' = \arcsin \frac{x}{2} + x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{2}$$

$$4 \text{ 解: 方程两边关于 } x \text{ 求导, } \frac{1}{y} y' = -ye^x - e^x y' \Rightarrow y' = -\frac{y^2 e^x}{1 + e^x}$$

$$5 \text{ 解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{f'(t) + tf''(t) - f'(t)}{f''(t)} = t,$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(t)}{dx} = \frac{1}{f''(t)}.$$

四 1 解: 设 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, 由 $f(-1) = -11$, $f'(-1) = 0$, $f(0) = 0$, $f''(0) = 0$, $f(2) = 16$, $f'(2) = 0$, 有 $a - b + c - d + e = -11$ ①, $-4a + 3b - 2c + d = 0$ ②, $e = 0$ ③, $2c = 0$ ④, $16a + 8b + 4c + 2d + e = 16$ ⑤, $32a + 12b + 4c + d = 0$ ⑥, 解得 $a = 1, b = -4, c = 0, d = 16, e = 0$, 即 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 16x$.四 2 解: 连续: $a + b + 2 = 0$; 可导: $b = a \Rightarrow b = -1, a = -1$

$$f'(x) = \begin{cases} -\cos x, & x > 0 \\ -e^{-x}, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$5 \text{ 解: } y = \left(7 \times \left(5 + \frac{x}{700} \right) + 29 \right) \cdot \frac{200}{x} = \frac{12800}{x} + 2x, (50 \leq x \leq 100)$$

$y' = 2 - \frac{12800}{x^2} = 0$, 解得取值范围内的唯一驻点 $x = 80$, 即为所求, 此时 $y(80) = 320$ 。

六 1 证: 设 $f(x) = \ln x + x - \frac{1}{2}$, 在 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$ 上连续, 且 $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} - \frac{3}{2} < 0$, $f(1) = \frac{1}{2} > 0$,

由零点定理知至少存在一点 $\xi \in \left(\frac{1}{e}, 1\right) \subset (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$, 即方程 $\ln x = \frac{1}{2} - x$ 至少有一个不超过 1 的正根。

六 2 证: 令 $F(x) = e^x f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 故存在

$\eta \in (a, b)$, 使 $e^\eta [f(\eta) + f'(\eta)] = \frac{e^b f(b) - e^a f(a)}{b - a} \stackrel{\because f(a) = f(b) = 1}{=} \frac{e^b - e^a}{b - a}$, 又因为函数

$\varphi(x) = e^x$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 故存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $e^\xi = \frac{e^b - e^a}{b - a}$,

从而得 $e^\eta [f(\eta) + f'(\eta)] = e^\xi$, 即 $e^{\eta - \xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1$ 。

8 浙江理工大学 2011—2012 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一 选择题

1. D 2. B 3. C 4. C 5. C 6. D

二 填空题

1 $a = -7, b = 6$; 2 $c = \ln 2$; 3 $x = -2$; 4 $k = \frac{1}{3}$; 5 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$,

$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$; 6 $(\sin x + x \cos x) f'(x \sin x) dx$;

三 简答题

1 解: 由 $\frac{n(3n+1)}{2(n^2+n)} \leq x_n \leq \frac{n(3n+1)}{2(n^2+1)}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(3n+1)}{2(n^2+n)} = \frac{3}{2}$ 和 $\lim_{n \leftarrow \infty} \frac{n(3n+1)}{2(n^2+1)} = \frac{3}{2}$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n^2+1} + \frac{n+2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n+n}{n^2+n} \right) = \frac{3}{2}$$

2 解: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{\frac{3}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{\left(-\frac{1}{2x}\right) \left(\frac{3}{\sin x}\right) (-2x)} = e^{-6}$

3 解: 两边取对数, $\frac{1}{y} \ln x = \frac{1}{x} \ln y$, 或 $x \ln x = y \ln y$,

两边关于 x 求导, $\ln x + 1 = y' \ln y + y'$,

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1 + \ln x}{1 + \ln y}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1 + \ln y}{1 + \ln x}$$

4 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - 1}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - e^x \sin x}{2 \cos 2x} = \frac{1}{2}$

5 解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2}$,

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{t}{2})}{\frac{d}{dt}(\ln(1+t^2))} = \frac{1+t^2}{4t}。$$

6. 解: $y' = -\frac{1}{x^2} + 2x$, $y'' = \frac{2}{x^3} + 2 = 0$, $x = -1$, 左右二阶导异号, 拐点 $(-1, 0)$,

$$y'(-1) = -3,$$

\therefore 所求切线方程为: $y = -3(x+1)$, 即 $3x + y + 3 = 0$ 。

四 解: 连续: $a + b = 4$; 可导: $2b = -4 \Rightarrow b = -2$, $a = 6$

$$f'(x) = \begin{cases} -4x, & x \leq 1 \\ -\frac{4}{x^2}, & x > 1 \end{cases}$$

五 解: 莱布尼茨公式:

$$(u \cdot v)^{(n)} = C_n^0 u^{(n)} \cdot v + C_n^1 u^{(n-1)} v' + C_n^2 u^{(n-2)} v'' + \cdots + C_n^n u \cdot v^{(n)}$$

$$y^{(n)} = e^x (x^2 + 2x + 2) + C_n^1 (2x + 2)e^x + C_n^2 2e^x$$

$$= e^x [x^2 + 2(n+1)x + n^2 + n + 2]$$

六 解: 教材 P168, 例 3。

七 证明: 不妨设 $x_1 < x_2$, 记 $x_0 = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$, 则 $x_1 < x_0 < x_2$ 。

$\Rightarrow x_0 - x_1 = (1-\lambda)(x_2 - x_1)$, $x_2 - x_0 = \lambda(x_2 - x_1)$, 由 Lagrange 定理, 有

$$f(x_0) - f(x_1) = f'(\xi_1)(1-\lambda)(x_2 - x_1) \quad (1)$$

$$f(x_2) - f(x_0) = f'(\xi_2)\lambda(x_2 - x_1) \quad (2) \quad (x_1 < \xi_1 < x_0 < \xi_2 < x_2)$$

$$f''(x) > 0 \Rightarrow f'(x) \uparrow, \Rightarrow f'(\xi_1) < f'(\xi_2), (1) \times \lambda - (2)(1 - \lambda), \text{得:}$$

$$f(x_0) - [\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)] = [f'(\xi_1) - f'(\xi_2)]\lambda(1 - \lambda)(x_2 - x_1) \leq 0$$

$$\Rightarrow f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)。$$

9 浙江理工大学 2010—2011 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一、选择题。







1-6 B A B B B C

二、1、2 2、 $\frac{1}{\pi-1}$ 3、 -2009×2008 4、4-6 5、 $(e, 1)$ 6、 $x = 0$

三、1、不存在 2、1（提示：等价代换、洛必达法则）

$$3、y' = \frac{e^x}{\sqrt{1+e^{2x}}} \quad 4、y'' = -2(y^{-3} + y^{-5}) \quad 5、a = b = -2$$

四、定义域： $x \neq \pm 1$ ，奇函数，渐近线： $x = \pm 1$ ， $y = x$ ，图略。

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
y'	+	0	—	null	—	0	—	null	—	0	+
y''	—	—	—	null	+	0	—	null	+	+	+
y		极大值 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$		间断		拐点 (0, 0)		间断		极小值 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$	

五、(1,3)

六、1、提示：令 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - \arctan x$ ，利用单调性证明

2、提示：构造函数 $F(x) = e^{-\lambda x} f(x)$ ，在 $[a, b]$ 上利用罗尔定理证明

10 浙江理工大学 2008-2009 学年第 1 学期《高等数学 A1》期中试题

一 选择题 (每小题 4 分, 共 28 分)

1. B. 2. A. 3. D. 4. D. 5. C. 6. A. 7. C.

二 填空题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1、 $x^2 - 3$ 2、 $-\frac{1}{3}$ 3、 $a = 3, b = -2$ 4、1 5、-1

三 试解下列各题 (每小题 6 分, 共 24 分)

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(1+x)] \tan 3x}{x \sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 3x}{x \cdot 2x} = \frac{3}{2}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-2} \right)^{2x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{3}{x-2} \right)^{\frac{x-2}{3}} \right)^{\frac{3}{x-2}(2x-1)} = e^6$$

$$3. \text{ 设 } \begin{cases} x = a(\sin t - t \cos t) \\ y = a(\cos t + t \sin t) \end{cases}, \text{ 求 } \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\text{解: } \frac{dx}{dt} = at \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = at \cos t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \cot t$$

$$\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt} = -\csc^2 t$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt} = -\frac{\csc^3 t}{at}$$

4. 已知 $y = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$, 求 dy

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} = \arctan x$$

$$\therefore dy = \arctan x dx$$

四 证明题

(1) (4 分) 当 $x > 0$ 时, 则 $e^x > 1+x$

证: 令 $f(x) = e^x - 1 - x$, 则当 $x > 0$ 时, $f'(x) = e^x - 1 > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加。

则 $x > 0$ 时, $f(x) > f(0) = 0$, 即 $e^x > 1+x$

(2) (4分) 设 $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $\varphi(0)=0$, $\varphi(1)=1$ 。证明: 对

任意正整数 a, b , 必存在 $(0,1)$ 内的两个数 ξ 与 η , 使 $\frac{a}{\varphi'(\xi)} + \frac{b}{\varphi'(\eta)} = a+b$

证: 因为 $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $\varphi(0)=0$, $\varphi(1)=1$, 则由介值定理知, 对任意正整数 a, b ,

$\varphi(0) < \frac{a}{a+b} < \varphi(1)$, 至少 $\exists x_0 \in (0,1)$, 使得 $\varphi(x_0) = \frac{a}{a+b}$ 。

又因为 $\varphi(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上连续, 在 $(0, x_0)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理知,

至少 $\exists \xi \in (0, x_0)$, 使得 $\varphi'(\xi) = \frac{\varphi(x_0) - \varphi(0)}{x_0 - 0} = \frac{a}{(a+b)x_0} \quad \dots \textcircled{1}$

同理, $\varphi(x)$ 在 $(x_0, 1)$ 上也满足拉格朗日中值定理,

所以至少 $\exists \eta \in (x_0, 1)$, 使得 $\varphi'(\eta) = \frac{\varphi(x_0) - \varphi(1)}{x_0 - 1} = \frac{b}{(a+b)(1-x_0)} \quad \dots \textcircled{2}$

$\therefore \frac{a}{\varphi'(\xi)} + \frac{b}{\varphi'(\eta)} = a+b$

五 (5分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续导数, 对于 $[0,1]$ 上的每一个 x , 函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0,1)$ 内, 且 $f'(x) \neq 1$, 证明在开区间 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$

证: 令 $F(x) = f(x) - x$

(1) 存在性

显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $F(0) = f(0) - 0 > 0$, $F(1) = f(1) - 1 < 0$,

由零点定理知, 至少 $\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $F(\xi) = 0$ 即 $f(\xi) = \xi$ 。

(2) 唯一性 (反证法)

假设 $(0,1)$ 内还有一个异于 ξ 的点 η , 使得 $F(\eta) = 0$ 即 $f(\eta) = \eta$, 不妨设 $\xi < \eta$

因为 $F(x)$ 在 $[\xi, \eta] (\subset [0,1])$ 上可导, 又 $F(\xi) = F(\eta) = 0$

由罗尔定理知, 至少 $\exists \zeta \in (\xi, \eta)$, 使得 $F'(\zeta) = 0$ 即 $f'(\zeta) = 1$, 与条件 $f'(x) \neq 1$ 矛盾。

综合 (1) (2), 所以在开区间 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$

六（10分）求函数 $y = \frac{(x+1)^2}{x}$ 的定义域、单调区间、极值、曲线的凹凸区间以及渐近线并

作图。

解：

$$(1) x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

$$(2) y' = 1 - \frac{1}{x^2}, \quad x=0 \text{ 时, } y' \text{ 不存在, } x=\pm 1 \text{ 时, } y' = 0$$

$$y'' = \frac{2}{x^3}, \quad x=0 \text{ 时, } y'' \text{ 不存在}$$

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	+	0	-	不存在	-	0	+
y''	-	-	-	不存在	+	+	+
y	$\nearrow \cap$	极大值 0	$\searrow \cap$	间断	$\searrow \cup$	极小值 4	$\nearrow \cup$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{x} = \infty, \text{ 所以无水平渐近线}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^2}{x} = \infty, \text{ 所以有一条铅直渐近线: } x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{(x+1)^2}{x} - x \right] = 2, \text{ 所以有一条斜渐近线: } y = x + 2$$

(4) 做图：略

高等数学试题资料目录

- 1 高等数学 A1 期中试题汇编 1~10 套（试卷册）（第二版）
- 2 高等数学 A1 期中试题汇编 1~10 套（答案册）（第二版）**
- 3 高等数学 A1 期中试题汇编 11 套及以后（试卷册）（第二版）
- 4 高等数学 A1 期中试题汇编 11 套及以后（试卷册）（第二版）
- 5 高等数学 A1 期末试题汇编 1~10 套（试卷册）（第二版）
- 6 高等数学 A1 期末试题汇编 1~10 套（答案册）（第二版）
- 7 高等数学 A1 期末试题汇编 11 套及以后（试卷册）（第二版）
- 8 高等数学 A1 期末试题汇编 11 套及以后（试卷册）（第二版）
- 9 高等数学 A2 期中试题汇编 1~10 套（试卷册）（第二版）
- 10 高等数学 A2 期中试题汇编 1~10 套（答案册）（第二版）
- 11 高等数学 A2 期中试题汇编 11 套及以后（试卷册）（第二版）
- 12 高等数学 A2 期中试题汇编 11 套及以后（试卷册）（第二版）
- 13 高等数学 A2 期末试题汇编 1~10 套（试卷册）（第二版）
- 14 高等数学 A2 期末试题汇编 1~10 套（答案册）（第二版）
- 15 高等数学 A2 期末试题汇编 11 套及以后（试卷册）（第二版）
- 16 高等数学 A2 期末试题汇编 11 套及以后（试卷册）（第二版）
- 17 高等数学 A1 期中试题汇编五套精装版（试卷册）（第二版）
- 18 高等数学 A1 期中试题汇编五套精装版（答案册）（第二版）
- 19 高等数学 A1 期末试题汇编五套精装版（试卷册）（第二版）
- 20 高等数学 A1 期末试题汇编五套精装版（答案册）（第二版）
- 21 高等数学 A2 期中试题汇编五套精装版（试卷册）（第二版）
- 22 高等数学 A2 期中试题汇编五套精装版（答案册）（第二版）
- 23 高等数学 A2 期末试题汇编五套精装版（试卷册）（第二版）
- 24 高等数学 A2 期末试题汇编五套精装版（答案册）（第二版）